

**Guía en los límites de severidad: ratón**

		Leve	Moderada	Sustancial
<b>Peso corporal</b>	Peso	Pérdidas <10 %	10-20 %	>20 %
<b>Apariencia</b>	Postura	Arqueamiento transitorio (especialmente tras la inoculación)	Arqueamiento intermitente	Arqueamiento persistente
	Piloerección	Parcial	Marcada	Marcada con signos de arqueamiento, sin respuesta a estímulos
<b>Signos clínicos</b>	Respiración	Normal	Patrón intermitente anormal	Difícil y persistente
	Salivación	Transitoria	Intermitente con humedad bajo el mentón	Persistente, humedad permanente bajo el mentón
	Tremors	Transitorios	Intermitentes	Continuos
	Convulsiones	Ninguna	Intermitente (<10 minutos)	Continuas (eutanasiar si >10 minutos)
<b>Comportamiento espontáneo</b>	Postración	No	Transitoria <1 hora	Persistente >1 h (eutanasiar si >3 h.)
	Socialización	Interacción	Poca interacción	Ninguna interacción
<b>Respuesta a estímulos</b>	Comportamiento provocado	Cambios mínimos	Tenue (responde cuando se le estimula, ej. Cogerlo)	Sin respuesta a provocación o actividad externa